



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 25 de maig de 2016

**Avís 23/2016**

**Cultius:**

**Vinya, cirerer, ametller, avellaner, noguer, olivera, presseguer i nectarina, cítrics i horta**

### **CALAMARSA**

Com que la tarda del diumenge 22, es va produir una calamarsa a la Conca de Barberà, a la zona de Vimbodí, l'Espluga de Francolí, Blancafort, Solivella, Sarral i Pira, recordem que vam recomanar fer un tractament general en aquestes zones afectades el més aviat possible, preferiblement dins de les següents 48 hores. En el cultiu de l'olivera cal utilitzar compostos de coure, a la vinya compostos de coure barrejats amb Folpet, i en fruiters de pinyol i de llavor es pot utilitzar el captan

### **Vinya:**

#### **Míldiu**

Seguim localitzant taques a les comarques del Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp i a la del Priorat a la dues zones, a la DO Montsant i a la DOQ Priorat. Al Baix Penedès ja vam avisar per fer un tractament la passada setmana i a les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i Priorat, on estem aproximant-nos a la floració, que és el moment més sensible a la malaltia, és va aconsellar fer el tractament del dilluns 23 fins el dijous 26.

A la comarca de la Conca de Barberà, on també hem començat a detectar taques, aconsellem fer un tractament de divendres 27 a dilluns 30.

En aquest estat fenològic de fort creixement és preferible utilitzar productes sistèmics

A les parcel·les que fan agricultura ecològica, han de continuar la protecció amb productes cúprics durant el període de floració.

#### **Cendrosa**

Seguim recordant la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s'ha de fer a l'inici de la floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols. per espolvoreig.

### **Cirerer:**

#### ***Drosophila suzukii***

S'han trobat els primers danys en les varietats primerenques a la zona del Priorat. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat.

A la resta de comarques, cal estar atents a la cirera primerenca ja que les condicions actuals són favorables pel seu desenvolupament.

Recordeu avisar a aquest servei si es detecten els primers danys.

#### **Autoritzacions excepcionals:**

- Del 15 d'abril fins el 14 d'agost de 2016:
  - Spinosad 48% SC, màxim 2 aplicacions espaiades en 7 dies, i termini de seguretat de 7 dies.
  - Ciantraniliprole 10%, màxim 2 aplicacions espaiades en 10 dies, i termini de seguretat de 7 dies.
- Del 29 d'abril fins el 15 d'agost de 2016, com a complement en la lluita s'han autoritzat els atraients per a captura massiva a base de:
  - Proteïnes hidrolitzades 5,5% [5L] P/P y 5,72%, a100-150 trampes/ha
  - Vinagre 258 g/l, a 80-150 trampes/ha.

**Important:** No està autoritzada la utilització dels formulats a base de Dimetoat com a insecticida contra *Drosophila suzukii* en cirerer.

[Full informatiu](#)

### **Ametller:**

#### **Brot sec o fusicocum**

A les finques amb problemes d'aquesta malaltia i amb varietats sensibles, recordem la necessitat de protegir els arbres durant el maig, especialment si es produeixen pluges i altes humitats.

#### **Pugó**

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

### **Avellaner:**

#### **Diabló**

**Part baixa del camp de Tarragona:** En els controls realitzats estem trobant poblacions baixes.

#### **Pugó**

Vigileu la presència de pugó al revers de les fulles. En cas d'intervenir utilitzeu productes respectuosos amb els àcars fitoseids per evitar desequilibris d'aranya.

### **Noguer:**

#### **Carpocapsa**

Ens trobem en primera generació, cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

#### **Antracnosi**

Recordeu que el segon tractament s'ha de fer al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard.

### **Olivera:**

#### **Repilo o ull de gall**

Les darreres pluges i humitats són favorables per aquesta malaltia, especialment si la presència d'inòcul és important. Així doncs, recordeu la importància de mantenir els arbres protegits.

Les mesures culturals, com una poda que afavoreixi la ventilació de la copa del arbre o

realitzar un adobat equilibrat de nitrogen, contribueixen a disminuir la incidència del fong.

### **Corc (*Hylesinus toranio*)**

A les finques on s'observen branques seques degudes al corc que està afectant especialment a la zona del Baix Camp, és important aprofitar l'esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per davant de la part afectada.

## **Presseguer i nectarina:**

### **Pugó**

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades.

### **Cendrosa**

Cal protegir els fruits des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol, especialment en les varietats sensibles.

## **Cítrics:**

### **Pugó**

Estem detectant presència de pugó a la zona del Baix Camp. Cal estar atents.

### **Mosca de la fruita o *Ceratitis capitata***

Ja estem detectant presència de mosca, en varietats tardanes de taronja i en llimoner. Cal doncs protegir la fruita prestant atenció al termini de seguretat.

## **Horta:**

### **Tomaquera a l'aire lliure**

#### ***Tuta absoluta***

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

### **Tomaquera en hivernacle**

#### ***Tuta absoluta***

Ja es poden observar els primers danys. Recordeu que la introducció de mírids depredadors ens pot fer un bon control de la plaga a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca que comença a estar present en alguns hivernacles.

L'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

#### **Àcar del bronzejat**

S'ha trobat la presència d'aquest àcar en algun hivernacle. Recordeu que cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades.

## Ceba, enciam i patata

### Míldiu

Els períodes de pluja són favorables per la proliferació d'aquesta malaltia, per la qual cosa, cal fer els tractaments oportuns.

## Enciam i col

### Pugó

S'estan trobant colònies de pugó, vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, si és necessari tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

Recordeu que en la lluita contra el pugó existeixen una gran quantitat d'enemics naturals i que disposar de marges florits ens ajuda a atraure'ls als nostres cultius.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)