



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 04 d'agost de 2015  
**Avís 58/2015**

**Cultius:**

**Vinya, olivera, avellaner, noguer, fruiters de pinyol i horta**

### Vinya:

**Cuc del Raïm: Tercera generació**

**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide, Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

- **Baix Penedès:** ja es va donar l'avís.
- **Camp de Tarragona:**
  - **A la zona primerenca, a les zones mitjanes i a les zones tardanes** ja es va donar l'avís.
  - **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodonà, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra la màxima eclosió dels ous és diumenge 2, dilluns 3 i dimarts 4.
- **Priorat DO Montsant:**
  - **A les zones primerenques i a les zones mitjanes** ja es va donar l'avís.
  - **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal l'inici de l'eclosió és diumenge 2 i dilluns 3. La màxima eclosió és dimecres 5, dijous 6 i divendres 7.
  - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins estem en període de posta dels ous.
- **DOQ Priorat:**
  - **A les zones primerenques** ja vam donar l'avís.
  - **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, la màxima eclosió és dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5.
  - **A la zona tardana** com Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera l'inici de l'eclosió és dimecres 5 i dijous 6.
- **Conca de Barberà:**
  - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà, la màxima eclosió és dimecres 5, dijous 6 i divendres 7.
  - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga l'inici de l'eclosió dels ous és dimecres 5 i dijous 6.

- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarraí, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat la posta dels ous.

### **Podridura grisa o *Botrytis***

Aquest cap de setmana s'han produït en alguns indrets pluges de diferent quantitat. En els llocs on han estat importants, entre 20 i 40 litres, és aconsellable tractar contra el podrit per si es produeix el badat dels grans, que pot fer-se conjuntament amb el tractament del cuc dirigit als raïms. També cal recordar que dins dels 21 dies anteriors a la verema, no s'aconsella fer tractament amb fungicides per evitar problemes posteriors en la fermentació.

## **Olivera:**

### **Mosca de la oliva. *Bractocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

Només s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillena, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

## **Avellaner:**

### **Aranya**

Estigueu atents a l'aparició dels primers símptomes i tracteu si és necessari. S'estan trobant finques afectades.

## **Noguer:**

### **Carpocapsa**

Recordeu que cal continuar tenint el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

## **Fruiters de pinyol:**

### **Mosca de la fruita o ceratitis**

Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

### **Monilia**

Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

### **Cendrosa en fulla**

Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

### **Grafolita**

Recordeu que el llindar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

## **Horta:**

### **Tomàquet**

### ***Tuta absoluta***

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringiensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

### **Cuc del tomàquet o *Heliothis***

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

### **Míldiu**

Cal estar atents en aquelles finques a on ha plogut, ja que amb la presència d'aigua lliure, humitats relatives superiors al 90% i temperatures compreses entre 10 i 25°C, es pot produir la germinació d'aquest fong.

## **Mongeta**

### **Aranya**

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona  
Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

**Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)**

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)