



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 28 d'agost de 2015

Avís 63/2015

Cultius:

Vinya, oliver, noguer, fruiters de pinyol i horta

Vinya:

NOTA

Recordem de manera general, que dins dels 21 dies anteriors a la verema, no s'aconsella fer tractaments amb fungicides per evitar problemes posteriors en la fermentació.

Olivera:

Mosca de la oliva. *Bractocera oleae*

Comarca del Tarragonès, zona litoral del Baix Penedès i zona de Mont-roig, Cambrils, Montbrí i voltants del Baix Camp:

En els últims recomptes encara que s'ha iniciat l'augment de població, el nivell de picada es baix, per tant encara no es el moment de realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina

En agricultura ecològica cal seguir mantenint el cultiu protegit amb caolí, spinosad o *Beauveria bassiana*.

Resta de comarques: Cal estar atents al contestador.

Només s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

Noguer:

Carpocapsa

Recordeu que cal continuar tenint el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Fruiters de pinyol:

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Monilia

Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Grafolita	
	Recordeu que el llindar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.
Horta:	
General	
Erugues	
	Està augmentant la presència d'erugues, vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.
Tomàquet	
<i>Tuta absoluta</i>	
	Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb <i>Bacillus thuringensis</i> respectuós amb la fauna auxiliar.
Cuc del tomàquet o <i>Heliothis</i>	
	Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a <i>Tuta absoluta</i> ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.
Àcar del bronzejat (<i>Aculops lycopersici</i>)	
	Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.
Bajoca i fesol	
Aranya	
	Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.
Carabassa, carabassó i cogombre	
Cendrosa	
	Estem veient atacs de cendrosa. Manteniu els cultius protegits.
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat	
Enllaços d'interès:	
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres	
Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris	
Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12) Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 http://www.gencat.cat/daam ssv.t.daam@gencat.cat	