



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 08 de juny de 2015
Avís 26/2015

Cultius:

Vinya, avellaner, noguer, cirerer, presseguer i nectarina, cítrics, horta i parcs i jardins

Vinya

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide, Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

• **Baix Penedès:**

– **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell, s'ha iniciat la posta dels ous.

– **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albiniana, Bellvei i Banyeres s'ha iniciat el vol.

• **Camp de Tarragona:**

– **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils s'ha iniciat la posta dels ous

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls s'ha iniciat el vol.

• **Priorat DO Montsant:**

– **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, del Masroig i del Molar, ja s'ha iniciat el vol.

• **DOQ Priorat**

– **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar, s'ha iniciat el vol

Míldiu

S'han localitzat taques a les comarques del Priorat, El Baix Penedès i Camp de Tarragona. Solament queda localitzar-les a la Conca de Barberà. De moment, cal estar atents a com evoluciona la meteorologia. En cas de trobar noves taques, cal trucar al tècnic de l'ADV o a aquest servei.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s'haurà de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol.

Podridura grisa

Recordem que el primer tractament preventiu s'ha de fer al final de la floració, a la caiguda dels capitells florals.

Avellaner	
Diabló	
	Zones de muntanya: A les finques amb poblacions altes a partir de dilluns dia 8 ja es pot realitzar el primer tractament contra la picada alimentària.
Noguer:	
Carpocapsa	
	Ja ens trobem en primera generació, per tant cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.
Antracnosi	
	Recordeu que el segon tractament s'ha de fer al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard
Cirerer	
<i>Drosophila suzukii</i>	
	Actualment les poblacions són baixes. Igualment, en aquelles finques en les que s'observin danys es recomana protegir aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat. Recordeu que és molt important gestionar correctament el rebuig de cirera, i també retirar i destruir els fruits sobremadurats dels arbres així com els fruits caiguts a terra. Aviseu a aquest Servei si es detecten danys. Full informatiu
Presseguer i nectarina	
Mosca de la fruita o ceratitis	
	Ja s'han localitzat les primeres captures a la zona primerenca del Baix Camp. A partir d'ara, cal anar protegint les varietats des de l'inici del canvi de color.
Cítrics	
Mosca de la fruita o ceratitis	
	Ja estem detectant presència de mosca en varietats tardanes. Cal doncs protegir la fruita prestant atenció al termini de seguretat.
Poll roig de Califòrnia	
	Es recomana realitzar un tractament, entre els dies 9 i 14, contra la primera generació a tots aquells agricultors que en la passada collita van detectar més d'un 2% de fruits ocupats . Aquest tractament coincideix amb el del poll gris.
Horta:	
Horta en general	
Pugó i erugues	
	Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Mongeta

Aranya

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat