



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 16 de juny de 2015
Avís 32/2015

Cultius:

Vinya, avellaner, noguer, cirerer, presseguer i nectarina, cítrics, horta i parcs i jardins

Calamarsa

A la zona del Priorat del Lloar, Gratallops, Torroja i a la zona del Tarragonès de voltants de La Secuita i Salomó, aquesta darrera tarda i nit s'han produït calamarses. En els llocs afectats amb ferides als raïms i sarments, es recomana fer un tractament tan aviat com es pugui entrar a les finques, amb barreges de compostos cúprics i Folpet. En aquests llocs, on la pluja hagi estat superior als 10 litres, és convenient utilitzar la barreja de compostos cúprics i Folpet amb un producte sistèmic pel míldiu.

Vinya

Míldiu

Estem recollint dades de les pluges de la nit del dissabte 13, d'aquesta darrera nit i estem esperant poder valorar les pluges que s'estan produint avui. Com han estat importants, cal esperar a tenir tota la informació per poder decidir els períodes de tractament. Per això, cal estar atents a aquest contestador.

Recordem que solament queda localitzar taques a la Conca de Barberà i en el cas de trobar-ne, cal trucar al tècnic de l'ADV o a aquest Servei.

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

• Baix Penedès:

– **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell la màxima eclosió dels ous serà de dimarts 16 a dijous 18.

– **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres l'inici d'eclosió serà dimarts 16 i dimecres 17.

• Camp de Tarragona:

– **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils l'inici d'eclosió serà diumenge 14 i dilluns 15.

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls l'inici d'eclosió serà dimecres 17 i dijous 18.

– **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodon, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorç, s'ha iniciat la posta dels ous.

- **Priorat DO Montsant:**
 - **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, del Masroig i del Molar l'inici d'eclosió serà dilluns 15 i dimarts 16.
 - **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, del Molar, La Serra d'Armós, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella estem en període de posta d'ous.
 - **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal s'ha iniciat la posta.
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins s'ha iniciat el vol.
- **DOQ Priorat**
 - **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar estem en període de posta dels ous.
 - **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, s'ha iniciat la posta dels ous.
 - **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera s'ha iniciat la posta dels ous.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà i **a les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga s'ha iniciat el vol.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s'haurà de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol.

Podridura grisa

Recordem que el primer tractament preventiu s'ha de fer al final de la floració, a la caiguda dels capitells florals.

Avellaner

Diabló

Zones de muntanya: Ja es va donar l'avis del primer tractament contra la picada alimentària.

Part baixa del camp de Tarragona: Esteu atents al contestador per l'avis de picada de posta.

Aranya

Esteu atents als primers símptomes.

Noguer:

Carpocapsa

Ja ens trobem en primera generació, per tant cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

Fruiters

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Cirerer

Drosophila suzukii

Actualment les poblacions són baixes. Igualment, en aquelles finques en les que s'observin danys es recomana protegir aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Recordeu que és molt important gestionar correctament el rebuig de cirera, i també retirar i destruir els fruits sobremadurats dels arbres així com els fruits caiguts a terra.

Aviseu a aquest Servei si es detecten danys.

[Full informatiu](#)

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat